

Zu Ihrer Information

HPV-DNA, HPV-Test

(Hybridisierung)

A: F: EBM: Ab 1.01.2020 eingeschränkte Indikation beachten:
Abklärung auffälliger grenzwertiger PAP-Befunde zwischen 30 und
34 Jahren, sonst ab 35. Lj PAP und HPV-Test.

Oral-/Analkarzinome bei F + M: GOÄ

M: Bürstenabstrich für HR-HPV-Nachweis (HR, high risk)

T: Sondentest, z. Zt. [F]

B: ● Mundhöhlen- Pharynxkarzinome: Als wichtigste Risikofaktoren für Oropharynxkarzinome galten lange Zeit der Konsum von Alkohol und Tabakwaren, sowie in einigen Regionen vor allem des südostasiatischen Raumes, das Kauen von Betelnüssen.

In den letzten Jahrzehnten nahm die Bedeutung viraler Infektionen (HPV) im Bereich des Oropharynx und Analbereich zu.

Ursache hierfür: Oral- und Analsex.

Therapie: Radiochemotherapie

Lit: 1. R. Siegel et al: Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Anal- und Analrandkarzinomen. Deutsches Ärzteblatt 118 (2021), Heft 13, 217-224
2. L. Jansen, J. Moratin: Mundhöhlen- und Pharynxkarzinome: Inzidenz, Mortalität und Überleben in Deutschland . Bundesgesundheitsbl. 2021, 64, 941–950

I: F: Detektion einer HPV-Infektion des Gebärmutterhalses
Mundhöhlen- und Pharynxkarzinome
Analkarzinome